

Các loại vắc-xin COVID-19 cho trẻ em và thanh thiếu niên

HẦU HẾT TRẺ EM VÀ TẤT CẢ THANH THIẾU NIÊN ĐỀU CÓ THỂ TIÊM VẮC-XIN COVID-19

CDC KHUYẾN CÁO MỌI NGƯỜI TỪ 5 TUỔI TRỞ LÊN HÃY NHẬN MỘT VACCINE COVID-19 ĐỂ GIÚP BẢO VỆ CHỐNG LẠI COVID-19.

	Pfizer-BioNTech (COMIRNATY)	Moderna	J&J / Janssen
Trẻ em dưới 4 tuổi	✗	✗	✗
5-11	✓	✗	✗
12-17	✓	✗	✗
18+	✓	✓	✓

Tiêm phòng COVID-19 rộng rãi là một biện pháp quan trọng để bảo vệ tốt nhất cho tất cả mọi người, đặc biệt là những người có nguy cơ cao nhất, khỏi bệnh trở nặng và tử vong. Những người được tiêm chủng đầy đủ có thể tiếp tục nhiều hoạt động như trước đại dịch một cách an toàn. Trẻ em từ 5 tuổi trở lên có thể tiêm một liều vắc-xin COVID-19 Pfizer-BioNTech phù hợp với lứa tuổi.

Tại sao trẻ em và thanh thiếu niên nên chủng ngừa COVID-19

Mặc dù COVID-19 có xu hướng nhẹ hơn ở trẻ em so với người lớn, nhưng nó có thể khiến trẻ bị ốm nặng và phải nhập viện. Trong một số tình huống, các biến chứng do nhiễm bệnh có thể dẫn đến tử vong.

Mặc dù trẻ em có nguy cơ bị trở nặng thấp hơn so với người lớn, nhưng trẻ em vẫn có thể:

- Bị mắc COVID-19
- Bị bệnh trở nặng do COVID-19;
- Có các biến chứng sức khỏe cả ngắn hạn và dài hạn
- Lây COVID-19 cho những người khác

Các loại vắc-xin COVID-19

An toàn cho trẻ em và thanh thiếu niên

GIÚP BẢO VỆ CON BẠN, GIA ĐÌNH BẠN VÀ NHỮNG NGƯỜI KHÁC.

TIÊM VẮC-XIN COVID-19 CÓ THỂ GIÚP BẢO VỆ TRẺ EM 5 TUỔI TRỞ TRÁNH BỊ MẮC COVID-19.

- Tiêm phòng cho trẻ em có thể giúp bảo vệ các thành viên trong gia đình, bao gồm cả các anh chị em không đủ điều kiện tiêm chủng và các thành viên trong gia đình có thể có nguy cơ trở nặng cao hơn nếu họ bị mắc bệnh.
- Tiêm phòng cũng có thể giúp tránh bệnh trở nặng ngay cả bị mắc COVID-19.
- Tiêm phòng cho trẻ từ 5 tuổi trở lên có thể giúp trẻ đi học bình thường và đảm bảo an toàn cho trẻ khi tham gia vào các hoạt động thể thao, vui chơi và các hoạt động nhóm khác.

CHUẨN BỊ CHO TRẺ EM VÀ THANH THIẾU NIÊN KHI TIÊM VẮC-XIN

Trải nghiệm tiêm vắc-xin COVID-19 sẽ rất giống với trải nghiệm tiêm vắc-xin thông thường.

- Bạn không nên cho trẻ dùng thuốc giảm đau trước khi tiêm để tránh các phản ứng phụ.
- Cho bác sĩ hoặc y tá biết về bất kỳ tình trạng dị ứng nào của trẻ.
- Sau khi con bạn tiêm vắc-xin COVID-19, bạn sẽ được yêu cầu ở lại trong vòng 15–30 phút để có thể quan sát con bạn trong trường hợp trẻ bị phản ứng dị ứng nghiêm trọng và cần được điều trị ngay lập tức.



Trước khi khuyến cáo tiêm vắc-xin COVID-19 cho trẻ em, các nhà khoa học đã tiến hành nhiều thử nghiệm lâm sàng. FDA đã cấp phép khẩn cấp cho vắc-xin COVID-19 Pfizer-BioNTech để sử dụng cho trẻ em từ 5-15 tuổi và hoàn toàn chấp thuận sử dụng cho người từ 16 tuổi trở lên. Tìm hiểu thêm về quy trình phát triển, ủy quyền và phê duyệt vắc-xin COVID-19.

LỢI ÍCH CỦA VIỆC TIÊM VẮC-XIN COVID-19 LỚN HƠN NHIỀU NHỮNG RỦI RO CÓ THỂ CÓ HÃY CHO TRẺ TỪ 5 TUỔI TRỞ LÊN TIÊM VẮC-XIN COVID-19 SỚM NHẤT CÓ THỂ.